



6.4.5 Stoppen medicatie (functie W > S)

```

F3:Medicatie F4:Admin. F5:Relatiebeheer F6:Kontakten F10:Communicatie
----- [post] -----
Mej A VAN EIJNDHOVEN [ 29] V/02-02-1970 0000056/0000057
TETERINGSEDIJK 61 Apo/arts: D/A1
4871 ER BREDA Verz.: Patient
----- [comm] [bew] -----
+----- Stoppen medicatie -----+
|Arts |Einddatum : 24021999 |
|Memo/s;Keuze : F8:Einde ESC:Afbreken |
|Hoevee+----- Recept : 62/1 -+
+----- Medicatiehistorie tussen 11-1998 en 02-1999 -----+
Vdat Etiketnaam Ap Edat Hoev/eh Dos Recnr H Arts W
1 230299 AMOXICILLINE C 500MG 050399* 20ST 3.1C 40 A1
2 190299 DIAZEPAM TABL 10MG 010399* 10ST 1.1 38 A1 A
3 280199 DAKTARIN CREME 20MG/G 110299 30G 2. DA BEEKE
4 280199 MARVELON TABL 280499* 90ST GB BEEKE
*Einde*

F2:Terug ESC:Afbreken F8:Einde *Einde bestand*
----- Alles -----

```

Figuur: Stoppen medicatie

Indien blijkt dat het geneesmiddel niet meer gebruikt mag worden is het aan te bevelen om **via de medicatiestatus** het betreffende voorschrift te stoppen. Als dit wordt gedaan, wordt ook het laatste geleverde voorschrift in de medicatiehistorie gestopt. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin ook 'oude' voorschriften moeten worden gestopt.

Na het ingeven van de functie "S" (Stoppen), verschijnt er een scherm waarin de (nieuwe) theoretische einddatum is vermeld (de datum-van-vandaag). Men heeft nog de mogelijkheid om deze theoretische einddatum aan te passen.

Vervolgens is het mogelijk de reden van de wijziging op te geven via een selectie uit een van tevoren ingevoerde lijst (via F7 op "Code reden") of door het overslaan van de "Code reden" en vervolgens de omschrijving van de reden zelf in te geven.

N.B. Om te voorkomen dat een geneesmiddel (nogmaals) aan een patiënt wordt afgeleverd, dient op dit geneesmiddel een blokkade te worden gezet. Door de veel grotere vrijheid bij het selecteren van voor te schrijven geneesmiddelen vanuit de historie, hoeft men niet altijd de laatste verstrekking te selecteren en is geen sluitende controle te verkrijgen op gestopte medicatie. Derhalve:

- **Stoppen is: einde gebruik voorgeschreven geneesmiddel.**
- **Blokkeren is: voorkomen nieuw voorschrift.**

6.4.6 Wijzigen verrekenwijze (functie W > V)

Het is mogelijk om achteraf de verrekenwijze van een recept te wijzigen (tot de eerstvolgende declaratierun).

Bij het achteraf wijzigen van de verrekenwijze is er op alle niveaus een controle op 'Invordering' vermelding bij de patiënt. Tevens is bij 'Incasso' geen overboeking mogelijk.

6.4 Wijzigen voorschrift (functie W)

```

F3:Medicatie F4:Admin. F5:Relatiebeheer F6:Kontakten F10:Communicatie
----- [post][actie] -
CAM Jansma { 50] M/01-10-1953 0000010/0001234
Bastenakenstraat 15 S:123456 Apo/arts: C /PR
4902 AF Oosterhout NB Verz.: Patient *AFW*
----- [actie][aandacht][aflever][info][dossier][comm][bew] -
----- Medicatiestatus : Actueel -----
Afld S T Etiketnaam Afl.hoev Dos. Arts Eind HH.hoev AP
1 090404 G T ASPIRINE TABL 500MG 40ST 2.1T PRAKT 290404 Z
2 090404 G T CLAMOXYL CAPS 500MG 20ST 3.1C PRAKT 290404 Z
----- Medicatie historie tussen 05-2003 en 04-2004 -----
Vdat Etiketnaam Ap Edat Hoev/eh Dos Recnr H Arts W
1 010204 ASPIRINE TABL 500MG 290404* 30ST 1.1T PRAKT
2 010404 CLAMOXYL CAPS 500MG 290404* 60S Wijzigen
3 181203 ATACAND TABL 16MG 150104 28S+-----+
4 171203 PIROXICAM DISP TABL 10MG 160104 30S| Artskode |
5 171203 IBUPROFEN TABL 200MG 160104 30S| Blokkade |
*Einde* | Dosering/Einddatum |
| Herhalingen |
| Verrekenwijze |
| Intolerantie |
-----+-----+
F9:Menu F2:Terug ESC:Afbreken F8:Einde
----- Alles -

```

Figuur: Wijzigen voorschrift

Via de functie "W" (of via F7 en vervolgens "W") wordt de functie Wijzigen gegevens voorschrift geactiveerd. Elke wijziging op een voorschrift wordt separaat vastgelegd, zodat het later mogelijk is om na te gaan welke wijzigingen op het voorschrift zijn uitgevoerd, wanneer en door wie.

De volgende wijzigingen kunnen worden aangebracht:

- A Voorschrijvend arts van het voorschrift.
- B Ingeven of wijzigen van een blokkade.
- D Wijzigen van de dosering en de theoretische einddatum.
- H Wijzigen van de soort herhaling en de daarbij behorende rubrieken.
- S Stoppen van het voorschrift.
- K Verrekenwijze wijzigen.
- I Invoeren van een nieuwe intolerantie op basis van het betreffende voorschrift.